



# Признаки употребления наркотиков у подростков (для родителей и педагогов)

## Тревожные «звоночки» в поведении подростка

1. Появление высказываний о бессмысленности и тягости жизни.
2. Интерес к информации о наркотиках.
3. Убежденное отстаивание "свободы личности употреблять наркотики", идей о "необходимости наркотиков для человечества" и "бесперспективности борьбы с ними".
4. Стремление примкнуть к асоциальным группировкам.
5. Нарастающая хитрость, изворотливость и лживость.
6. Потеря энтузиазма, безразличие к делам, безынициативность – «потухшие глаза».
7. Потеря интереса к противоположному полу.
8. Частые и длительные уединения в туалете или ванной комнате.
9. Нарушения сна.
10. Повышенная апатия, сменяющаяся необъяснимой активностью.

### Деньги



1. Пропажа из дома денег, ценностей, одежды и т.д.
2. Регулярное заимствование денег у родственников.
3. Наличие значительных денежных сумм без объяснения причины их появления.
4. Противоправные действия или кражи вне дома.

### Скрытность

1. Нарастающая скрытность ребенка (возможно, без ухудшения отношений с родителями).
2. Самоизоляция в семье: ребенок избегает родителей, по телефону отвечает украдкой, появляется четко выраженное уклонение от домашнего общения, пренебрежение домашними правилами,

нарастает напряженность в семейных взаимоотношениях.

3. Частые просьбы отпустить на ночь из дома, либо отсутствие по ночам без причин.
4. Появление новых друзей, о которых подросток умалчивает.

## Учеба и увлечения

1. Резкое снижение успеваемости в школе.
2. Неспособность четко отвечать на вопросы.
3. Участившиеся прогулы занятий.
4. Потеря интереса к привычным увлечениям (хобби).
5. Появление у подростков в общении странных слов, связанных с употреблением наркотиков.

## Признаки того, что подросток употребляет курительную смесь

1. Кашель (смеси обжигают слизистую).
2. Сухость во рту (требуется постоянное употребление жидкости).
3. Мутные либо покрасневшие белки глаз.
4. Нарушение координации.
5. Дефекты речи (заторможенность, эффект вытянутой магнитофонной пленки).
6. Заторможенность мышления, смена настроения.
7. Неподвижность, застывание в одной позе при полном молчании (на 20 – 30мин.).
8. Бледность, учащенный пульс.
9. Безпричинные приступы смеха.
10. Безразличие к внешнему виду.



К возможным признакам передозировки наркотических веществ относятся: тошнота, рвота, головокружение, сильная бледность, иногда – потеря сознания, явное состояние опьянения без запаха спиртного.

## ВАЖНО!

**Родителям срочно необходимо обратиться к врачу при появлении данного комплекса признаков**