

При выявлении «+» анализа на COVID-19 к Вам на дом выйдет врач поликлиники, который определит тактику дальнейшего лечения.

При протекании заболевания в легкой форме лечение проводится в амбулаторных условиях

- Ежедневно Вам будут звонить из поликлиники и контролировать Ваше состояние здоровья;
- В случае ухудшения состояния к Вам повторно выйдет врач;
- Произведут забор контрольного мазка из носо- и ротоглотки дважды до получения отрицательных результатов.

В настоящее время все поликлиники Республики Крым обеспечены противовирусными препаратами для лечения новой коронавирусной инфекции.

Кому необходима госпитализация при подтверждении заболевания COVID-19?

- Пациентам с тяжелой и среднетяжелой формой течения COVID-19;
- Пациентам из групп риска (возраст 65+; с тяжелыми сопутствующими соматическими заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, сниженным иммунным статусом и т. д.);
- Беременным;
- Пациентам, находящимся на амбулаторном лечении при резком ухудшении состояния.

Показания для госпитализации определяет исключительно лечащий врач или бригада скорой медицинской помощи.

Что необходимо делать, если вы почувствовали симптомы болезни?

- Температура тела $> 38^{\circ}\text{C}$;
- кашель – сухой или со скудной мокротой;
- одышка, ощущение заложенности в грудной клетке;
- нарушение или потеря обоняния, потеря вкуса.

Незамедлительно сообщите в поликлинику по месту жительства о своем заболевании!!!

- До прихода врача поликлиники оставайтесь дома (используйте средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства – маска, спиртовые салфетки);
- по возможности находитесь в отдельной комнате;
- пользуйтесь отдельной посудой, индивидуальными средствами гигиены, бельем и полотенцами;
- максимально исключите контакты с членами своей семьи или другими лицами.

Не занимайтесь самолечением и самодиагностикой: назначение непоказанных (особенно антибактериальных) препаратов на ранних стадиях заболевания может лишь ухудшить его течение!

Решение о выполнении различных дополнительных методов диагностики (в том числе компьютерной томографии) принимается исключительно лечащим врачом, после осмотра. Выполнение одной КТ органов грудной клетки по дозе лучевой нагрузки приравнивается к 60–350 рентгеновским снимкам и может оказать больше негативный эффект, чем позитивный.

При подозрении на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 поликлиникой по месту жительства будет организован забор анализов с целью подтверждения диагноза.