



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И ГОРОДУ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЮ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ПО ВОСТОЧНОМУ КРЫМУ

ул. Чкалова, 62, г. Феодосия, 298100

Начальнику МКУ «Управление
образования города Феодосии
Республики Крым»
Абляизовой Э.Р.
upravlenie5@yandex.ru

Начальнику отдела образования
администрации города Судака
Вилковой Е.Д.
kondrat@sudakgs.rk.gov.ru
vilkova-ed@mail.ru

Начальнику отдела образования
администрации Кировского района
Республики Крым
Тигиевой И.А.

kir-centr.roo@crimeaedu.ru

E-mail to feodosiya@82.rospotrebnadzor.ru

26.10.2026 №82-01-10/03-07774-2026

На № _____ от _____

На основании письма Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю, исх. №82-00-03/10-10901-2026 от 15.10.2026, территориальный отдел Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю по Восточному Крыму информирует, что коклюш по-прежнему остается глобальной проблемой здравоохранения, несмотря на многолетнюю практику широкомасштабной иммунизации даже в странах мира, где иммунизация против коклюша проводится с 1980 – годов и регистрируется высокий уровень охвата профилактическими прививками. Наиболее резкий подъем заболеваемости коклюшем регистрировался в 2023-2024 гг.

Всего в Российской Федерации в 2023–2025 гг. и за 6 месяцев 2026 года проведено 1 010769 исследований на коклюш.

При коклюше, вызванным возбудителем *B. pertussis*, было классифицировано три варианта клинического течения – типичная картина с приступообразным кашлем, стертая форма и бактерионосительство. Стертый вариант клинического течения диагностировать и заподозрить трудно. Это связано с тем, что при стертом течении болезни кашель носит характер трахеального или трахеобронхиального, сопровождается ринитом и разлитой гиперемией ротоглотки.

При анализе очагов коклюша, вызванных возбудителем *B. pertussis* за 6 мес. 2026 г. в большинстве случаев регистрировалось легкое типичное течение, а в 46,8 % случаев у больных с бессимптомным течением заболевания и с атипичной формой возбудитель был выявлен только при лабораторном обследовании контактных в очаге.

Таким образом, после резкого подъема заболеваемости, вызванного *B. pertussis*, в настоящее время на территории Российской Федерации наблюдается

аналогичная тенденция увеличения активности циркуляции других бордетелл и рост циркуляции *B. parapertussis*.

Необходимо обратить внимание на то, что наличие стертых форм и бактерионосительства может способствовать недоучету инфекции и формированию очагов в образовательных учреждениях.


Таким образом, учитывая продолжающейся активный эпидемический процесс по коклюшной инфекции, необходимо обеспечить:

- Организацию мероприятий по максимальному разобщению детей и взрослых, находившихся в прямом близком контакте с заболевшими, от остального коллектива при регистрации групповых очагов в детских образовательных организациях, специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа, организациях отдыха детей и их оздоровления.
- Проведение санитарно-просветительной работы с целью увеличения настороженности к коклюшной инфекции, в том числе приверженности к вакцинопрофилактике для всех возрастных групп.

В связи с этим, направляем Вам памятку по профилактике коклюша для размещения на сайтах образовательных учреждений.

Приложение: Памятка по профилактике коклюша - на 2-х листах.

Начальник территориального отдела
по Восточному Крыму



С.А. Касьянова

Попова С.В.
+79787114135